vacina

DENGUE

tudo o que você precisa saber

Pró Imune Vacinação

DENGUE

1 Por que vacinar?

A dengue é uma doença viral que inclui quatro grupos distintos DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. Sua transmissão se dá através da picada do mosquito Aedes aegypti, principal vetor da doença no Brasil.

Não é uma doença transmitida de pessoa para pessoa e afeta indivíduos de qualquer idade.

Cerca de 390 milhões de pessoas são infectadas anualmente em todo o mundo, sendo que meio milhão evoluem para formas mais graves da doença e 25.000 morrem. No Brasil, em 2015, foram reportados mais de 1.600.000 casos suspeitos da doença, onde 20.000 foram classificado como alarmantes, 1.600 episódios graves e 863 óbitos.

Os sintomas da doença são a febre alta, dores musculares, fadiga, mal estar, cefaleia e erupções cutâneas. Em casos mais graves pode haver hemorragia intensa e choque hemorrágico, podendo ser fatal. Os indivíduos infectados pela segunda vez têm um risco consideravelmente maior de desenvolver a doença grave.

2 Vacina Dengue

A vacina é indicada para crianças a partir de 9 anos de idade, adolescentes e adultos até 45 anos, que já tenham sido previamente infectados pelo vírus da dengue (soropositivos com ou sem história da doença). O esquema vacinal é de 3 doses com intervalo de 6 meses entre elas, por via subcutânea.

A eficácia da vacina na prevenção da doença é de 65,5%; na prevenção de dengue grave e hemorrágica é de 93% e de internação é de mais de 80%.

3 Algumas pessoas não devem tomar essa vacina?

A maior parte das pessoas podem tomar todas as vacinas sem qualquer risco. Mas há exceções que são:

√ Uma pessoa que esteja doente no dia marcado para tomar as vacinas poderá voltar em outro dia para tomá-las.

√ Qualquer pessoa que tenha tido uma relação alérgica com risco de vida após tomar uma vacina não deve tomar outra dose da mesma.

√ Uma pessoa que tenha uma reação alérgica grave (com risco de vida) a uma substância não deve tomar nenhuma vacina que contenha esse componente. Informe o profissional de saúde se a pessoa que está sendo vacinada tem quaisquer alergias graves.

√ Se você estiver grávida ou amamentando (só deve ser usada durante a gravidez se for realmente necessário).

√ Se tiver um sistema imune enfraquecido por causa de uma doença (como câncer ou HIV/AIDS) ou tratamentos médicos (como radiação, imunoterapia, esteroides de alta dose ou quimioterapia).

√ Pessoas que não tiveram contato prévio com o vírus da dengue (soronegativos). Em áreas endêmicas, o profissional de saúde deve avaliar a necessidade da aplicação (regiões onde pelo menos 70% das pessoas sejam soropositivas para o vírus).

4 Riscos de reação à vacina

Como com qualquer medicamento, as vacinas também podem causar efeitos colaterais.
Elas são normalmente leves e desaparecem sozinhas, mas reações sérias também são possíveis, mas são raras. A maioria das reações não são graves. Por ser uma vacina de vírus vivos, as reações adversas são tardias, normalmente entre 5 e 20 dias após a vacinação. As reações tendem a ser menores após a segunda e terceira dose.
Os sintomas mais comuns relatados foram:

√ Febre;
√ Vermelhidão na pele ou erupção cutânea no local da injeção;
√ Mal-estar e fraqueza;
√ Dor de cabeça.

5 Problemas que podem surgir após a administração de qualquer vacina injetável:

√ As pessoas às vezes desmaiam após um procedimento médico, incluindo a vacinação. Sentar-se ou deitar-se por cerca de 15 minutos pode ajudar a evitar desmaios e lesões causadas por uma queda. Informe o profissional de saúde se sentir tontura ou tiver alterações de visão ou zumbido nos ouvidos.

√ Algumas pessoas têm dores fortes no ombro e dificuldade de movimentar o braço no qual foi administrada a injeção. Isso acontece muito raramente.

√ Qualquer medicamento pode causar uma reação alérgica. Essas reações à uma vacina são muito raras, cerca de uma ocorrência em um milhão de doses, e geralmente ocorrem dentro de poucos minutos a algumas horas após a vacinação.

√ A segurança das vacinas é continuamente controlada.

6 E se houver uma reação grave?

O que devo observar?

√ Qualquer sintoma que possa parecer preocupante, como sinais de reações alérgicas graves, febre muito alta ou alterações no comportamento. Os sinais de uma reação alérgica grave incluem urticária, inchaço no rosto ou garganta, dificuldade para respirar, taquicardia, tontura e fraqueza ou sonolência incomum – normalmente de poucos minutos a algumas horas após a vacinação.

O que devo fazer?

√ Se suspeitar de uma reação alérgica grave ou outra emergência que não possa esperar, vá para o hospital mais próximo. Caso contrário, ligue para o seu médico.

√ Depois, a reação deve ser comunicada ao “Sistema de Relatórios de Eventos Adversos Relacionados a Vacinas” da Secretaria da Saúde. Esse relatório deve ser preenchido pelo seu médico ou pela clínica onde foi vacinado.

7 Como posso obter mais informações?

√ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir outras fontes de informações.
√ Ou consulte:
www.proimune.com.br
www.facebook.com/proimune
www.instagram.com/proimune_oficial