



vacina

ROTAVÍRUS

As primeira vacinas do bebê
tudo o que você precisa saber



1 Por que vacinar?

O rotavírus é um vírus que provoca diarreia, principalmente em bebês e crianças pequenas.

A diarreia pode ser grave e causar desidratação.

Vômito e febre também são comuns.

Antes do desenvolvimento da vacina contra rotavírus, a doença era um problema de saúde sério e muito comum em crianças brasileiras.

Quase todas as crianças no Brasil tiveram pelo menos uma infecção por rotavírus antes dos 5 anos.

Todos os anos, antes que a vacina fosse disponibilizada:

- √ Mais de 400.000 crianças pequenas tinham que consultar um médico por causa da doença provocada pelo rotavírus,
- √ Mais de 200.000 tinham que ir ao pronto-socorro,
- √ 55.000 a 70.000 tinham que ser hospitalizadas
- √ E 20 a 60 morriam.

Desde a introdução da vacina contra rotavírus, as hospitalizações e idas ao pronto-socorro devido a doença caíram drasticamente.

2 Vacina Rotavírus

Há duas vacinas contra o rotavírus disponíveis. Seu bebê tomará 2 ou 3 doses, dependendo do produto utilizado, porém ambas são aplicadas por via oral.

As doses são recomendadas nas seguintes idades:

- √ Primeira dose: 2 meses de idade
- √ Segunda dose: 4 meses de idade
- √ Terceira dose: 6 meses de idade (se necessário)

Importante:

Seu filho precisa tomar a primeira dose da vacina contra o rotavírus antes de 15 semanas de idade e a última dose até 7 meses e 29 dias. A vacina contra rotavírus pode ser tomada com segurança ao mesmo tempo que outras vacinas.

A vacina não prevenirá diarreia ou vômitos causados por outros germes.

3 Alguns bebês não devem tomar essa vacina?

A maior parte das crianças podem tomar todas estas vacinas sem qualquer risco. Mas há exceções:

- √ Bebês que estiverem levemente doentes podem tomar a vacina. Bebês que estiverem moderadamente ou gravemente doentes devem esperar até que se recuperem. Isso inclui bebês com diarreia ou vômitos moderados à graves.

✓ Um bebê que tenha tido uma reação alérgica com risco de morte a uma dose da vacina contra rotavírus não deverá tomar outra dose. Um bebê que tenha uma alergia grave a qualquer componente da vacina contra rotavírus não deve tomar a vacina. Informe o profissional de saúde se seu bebê tiver alguma alergia grave que você conheça, incluindo alergia grave a látex.

✓ Bebês com “imunodeficiência combinada grave” (IDCG) não devem tomar a vacina contra rotavírus.

✓ Bebês que tiverem tido um tipo de bloqueio intestinal chamado “intussuscepção” não devem tomar a vacina contra rotavírus.

4 Riscos de reação à vacina

Como com qualquer medicamento, as vacinas também podem causar efeitos colaterais. Elas são normalmente leves e desaparecem sozinhas, mas reações sérias também são possíveis, mas são raras. A maioria das reações não são graves:

- ✓ Irritabilidade
- ✓ Diarreia ou Constipação,
- ✓ Vômitos

Normalmente ocorrem no período de até 30 dias após a aplicação da vacina.

Reações raras:

✓ Há um pequeno risco de Intussuscepção geralmente dentro de uma semana após a 1ª ou 2ª dose da vacina. É um tipo de bloqueio intestinal que é tratado em hospital. Ela acontece “naturalmente” em alguns bebês e geralmente não há um motivo conhecido para isso. Estima-se que este risco ocorre em 1 a cada 100.000 bebês vacinados contra rotavírus.

5 Problemas que podem surgir após a administração de qualquer vacina injetável:

Problemas que podem surgir após a administração de qualquer vacina injetável:

Qualquer medicamento pode causar uma reação alérgica. Essas reações à uma vacina são muito raras, cerca de uma ocorrência em um milhão de doses, e geralmente ocorrem dentro de poucos minutos a algumas horas após a vacinação. A segurança das vacinas é continuamente controlada.

6 E se houver uma reação grave?

O que devo observar?

✓ Para intussuscepção, procure sinais de dor de estômago, juntamente com choro intenso. Logo no início, esses episódios podem durar apenas alguns minutos e ir e vir várias vezes em uma hora. Os bebês podem puxar as pernas em direção ao peito.

✓ Seu bebê também pode vomitar várias vezes ou ter sangue nas fezes, ou pode parecer fraco ou muito irritado. Esses sinais geralmente acontecem durante a primeira semana após a 1ª ou 2ª dose da vacina, mas observe-os a qualquer momento após a vacinação.

✓ Qualquer sintoma que possa parecer preocupante, como sinais de reações alérgicas graves, febre muito alta ou alterações no comportamento. Os sinais de uma reação alérgica grave incluem urticária, inchaço no rosto ou garganta, dificuldade para respirar, taquicardia, tontura e fraqueza ou sonolência incomum – normalmente de poucos minutos a algumas horas após a vacinação.

O que devo fazer?

✓ Se você achar que se trata de intussuscepção, ligue imediatamente para o médico. Se não conseguir falar com seu médico, leve o bebê para um hospital. Informe a eles quando seu bebê tomou a vacina contra rotavírus.

✓ Se suspeitar de uma reação alérgica grave ou outra emergência que não possa esperar, vá para o hospital mais próximo. Caso contrário, ligue para o seu médico.

✓ Depois, a reação deve ser comunicada ao “Sistema de Relatórios de Eventos Adversos Relacionados a Vacinas” da Secretaria da Saúde. Esse relatório deve ser preenchido pelo seu médico ou pela clínica onde foi vacinado.

7 Como posso obter mais informações?

✓ Pergunte ao profissional de saúde. Ele pode lhe fornecer a bula da vacina ou sugerir outras fontes de informações.

✓ Ou consulte:

www.proimune.com.br

www.facebook.com/proimune

www.instagram.com/proimune_oficial